

ČESKY

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny k použití, než začnete tento přípravek užívat.

- Návod k použití si uschovejte, možná si ho budete chtít později znovu přečíst.
- V případě jakýchkoli dalších dotazů se obraťte na svého lékaře, terapeuta, lékárníka nebo přímo na společnost FROXIMUN AG jako výrobce.
- Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu a volně prodejný.

1. Co je TOXAPREVENT® MEDI PLUS a k čemu se používá?

TOXAPREVENT® MEDI PLUS ve formě prášku je přírodní léčivý přípravek s minerální složkou MANC®, přírodním zeolitem klinoptilolitem s PLUS uhlíčenanem vápenatým a hořečnatým. Slouží k posílení bariéry střevní stěny při opakované fyzické zátěži. MANC® prochází trávicím traktem, vyvíjí zde svůj fyzikální účinek a není metabolizován.

2. Co musíte vědět, než začnete přípravek TOXAPREVENT® MEDI PLUS užívat?

- Balení se sáčky otevřete až bezprostředně před použitím, před rozmícháním prášku v tekutině.
- Vždy otvírejte pouze takové množství balení sáčku, které chcete použít v okamžiku vyjmutí.

Přípravek TOXAPREVENT® MEDI PLUS se nesmí užívat:

- V případě známé alergie nebo přecitlivělosti na jednu nebo více složek. (viz bod 6: Složení a složky)
- Vzhledem k dalším nedostatečným studiím na těhotných ženách a kojících matkách je nutné zamezit používání léčivých přípravků TOXAPREVENT® během těhotenství a kojení.

Při užívání přípravku TOXAPREVENT® MEDI PLUS je nutná zvláštní opatrnost:

- V ojedinělých případech může užívání přípravku TOXAPREVENT® MEDI PLUS ve formě prášku způsobit zácpu nebo plynatost. (ojediněle: může postihnout až 1 z 1000 léčených osob)
- Pokud trpíte chronickou zácpou, měli byste přípravek TOXAPREVENT® MEDI PLUS ve formě prášku užívat se zvláštní opatrností. V takových případech se před užitím přípravku poraďte se svým lékařem, terapeutem nebo lékárníkem.
- Při užívání přípravku TOXAPREVENT® MEDI PLUS ve formě prášku vždy zajistěte dostatečný příjem tekutin, abyste zabránili obstipačnímu (zácpovému) účinku.
- O užívání přípravku TOXAPREVENT® MEDI PLUS u dětí nejsou dostatečné zkušenosti. Proto se nedoporučuje používat u dětí mladších 12 let.
- Pokud máte sklon k tvorbě ledvinových kamenů, poraďte se před užíváním přípravku s lékařem.

Při užívání přípravku TOXAPREVENT® MEDI PLUS s léky:

K zamezení nežádoucím interakcím s léky je třeba dodržovat interval 2 hodiny, protože nejsou k dispozici žádné systematické studie o interakcích nebo ovlivnění léčivých přípravků požitím přípravku TOXAPREVENT® MEDI PLUS ve formě prášku. Pokud užíváte léky, poraďte se se svým lékařem nebo terapeutem o časovém intervalu užívání přípravku TOXAPREVENT® MEDI PLUS.

3. Jak se přípravek TOXAPREVENT® MEDI PLUS užívá?

- Pokud Vám lékař nebo terapeut nepředepsal jinak, užívejte 1 až 2 sáčky přípravku TOXAPREVENT® MEDI PLUS cca 30 minut před jídlem a pijte je dostatečným množstvím tekutiny (např. 200 ml neperlivé vody).
- Denní maximální dávka 2 sáčky (což odpovídá 2krát 3 g obsahu) by se neměla překročit.
- Pokud se chcete od dávky užívání odchýlit, poraďte se předem se svým lékařem nebo terapeutem.

Doba užívání

Doba léčby přípravkem TOXAPREVENT® MEDI PLUS by neměla překročit 30 dnů. V případě opakovaného užívání je třeba dodržet minimálně týdenní přestávku.

Protipatření v případě chyb při užívání, předávkování a nežádoucích účinků:

Pokud omylem užijete větší množství, než je zamýšlená dávka, může dojít ke zvýšení nežádoucích účinků. V těchto případech se doporučuje snížit množství na maximálně jeden sáček denně nebo v případě potřeby užívání přerušit. V takovém případě je třeba zajistit zvýšený příjem tekutin. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají, přestaňte přípravek užívat a poraďte se se svým lékařem nebo terapeutem.

4. Jaké vedlejší účinky jsou známy?

V ojedinělých případech se může objevit zácpa nebo plynatost (ojediněle: může postihnout až 1 z 1 000 léčených osob).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud zaznamenáte jakékoli vedlejší účinky, informujte svého lékaře, terapeuta nebo lékárníka. Nahlaste je také společnosti FROXIMUN AG pomocí níže uvedených kontaktních údajů:

Výrobce a ohlašovna:	FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt
Telefon:	+49 (0) 39401 632-0
Fax:	+49 (0) 39401 632-199
E-mail:	anwender@froximun.de
Odpovědná osoba:	+49 (0) 39401 632-320

5. Jak je nutné přípravek TOXAPREVENT® MEDI PLUS skladovat?

- uchovávejte mimo dosah dětí
- skladujte v suchu a při teplotě 5 °C - 40 °C
- chraňte před přímým slunečním světlem

ČESKY

- nepoužívejte déle, než je uvedeno
- použitelné do: viz skládací krabička nebo ražba/ potisk na obalu sáčku

6. Další informace

Složení a další složky

- 1 sáček obsahuje 3 000 mg prášku
- Složení: MANC® (přírodní zeolit-klinoptilolit), uhličitán vápenatý, uhličitán hořečnatý

Informace o MANC®:

- 100 % přírodní, bez lepku, bez laktózy
- U MANC® se jedná o modifikovaný hlinitokřemičitan.
- košer, halal: Tímto potvrzujeme, že MANC® je vyráběn v procesu z minerálních surovin. Výrobek neobsahuje živočišné složky, krev nebo její vedlejší produkty ani alkohol.
- Při výrobě MANC® se používají výhradně suroviny minerálního původu.

Informace o uhličitánu vápenatém a uhličitánu hořečnatém:

- bez alergenů
- košer, halal, vegetariánský, veganský

7. Informace o výrobcí

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt,
Telefon: +49 39401 632-0, fax: +49 39401 632-199,
eMail: info@froximun.de

Tento leták byl naposledy přepracován: 2023-09-19




Výstražné a bezpečnostní pokyny



Výrobce



Dodržujte
návod k použití



skladovat mezi
5 °C a 40°C



LOT,
Číslo šarže



skladujte
v suchu



uchovávejte mimo
dosah dětí



Použitelné
do



ochrana před
slunečním zářením



k požití vmíchejte
do tekutiny