



Veillez lire attentivement l'intégralité de la notice, avant d'utiliser le dispositif médical.

- Veillez conserver la notice d'utilisation. Vous pourriez avoir besoin de la relire ultérieurement.
- Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à votre médecin, thérapeute ou pharmacien ou directement à FROXIMUN AG en tant que fabricant.
- Ce dispositif médical est délivré sans ordonnance et est en vente libre.

1. Qu'est-ce que TOXAPREVENT® HALISTOP® et quelle est son utilisation ?

TOXAPREVENT® HALISTOP® est un dispositif médical de prévention et de thérapie contre l'halitose. Des substances malodorantes sont liées dans la cavité buccale, notamment sur la langue et sur les gencives sujettes à une inflammation.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TOXAPREVENT® HALISTOP® ?

- Retirez les comprimés à mâcher du blister juste avant de les prendre.
- Ne sortez que la quantité de comprimés à mâcher que vous souhaitez utiliser à l'instant.

TOXAPREVENT® HALISTOP® ne doit pas être pris dans les cas suivants :

En cas d'allergie ou d'hypersensibilité connue à un ou plusieurs composants. (voir point 6 : composants)

Il faut être particulièrement prudent lors de la prise de TOXAPREVENT® HALISTOP® dans les cas suivants :

Il n'y a pas suffisamment d'expériences, de données ou de retours négatifs concernant la prise de TOXAPREVENT® HALISTOP® par des femmes enceintes, allaitantes et par les enfants de moins de 12 ans. Si vous souhaitez quand même prendre le produit, parlez-en au préalable à votre médecin ou à votre pharmacien.

En cas de prise de TOXAPREVENT® HALISTOP® avec des médicaments :

Pour éviter toute interaction avec d'autres médicaments, il faut espacer les prises de 2 heures, car il n'y a aucune étude systématique relative aux interactions ou aux influences de médicaments lors de la prise de TOXAPREVENT® HALISTOP®.

3. Quand et comment prendre TOXAPREVENT® HALISTOP® ?

En principe, vous pouvez utiliser les comprimés à mâcher de façon préventive et thérapeutique. En prévention, vous pouvez par exemple prendre un comprimé après le repas pour prévenir l'apparition de la mauvaise haleine ou si vous avez l'impression de ne pas avoir une haleine fraîche. En thérapie, vous pouvez prendre un comprimé si la mauvaise haleine est causée par une inflammation dans la zone pharyngo-buccale. Vous pouvez prendre jusqu'à 8 comprimés à mâcher par jour. Ne prenez pas plus de comprimés à mâcher que la quantité indiquée. Si vous souhaitez quand même prendre plus de comprimés que la quantité indiquée, demandez à votre médecin ou pharmacien.

Durée d'utilisation

Vous pouvez prendre les comprimés à mâcher de façon continue pendant une période pouvant aller jusqu'à 30 jours. Ensuite, faites une pause d'1 semaine si vous souhaitez continuer d'en prendre.

Contre-indications en cas de mauvaise utilisation, de surdosage et effets secondaires :

Si vous prenez par inadvertance une plus grande quantité que la dose prescrite, des effets inhabituels possibles peuvent survenir. Dans ce cas, réduisez le dosage ou stoppez la prise pendant une courte période de temps, jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. En cas d'effets secondaires durables, stoppez la prise et consultez votre médecin ou votre thérapeute.

4. Quels sont les effets indésirables connus ?

Il n'existe aucun effet indésirable connu.

Déclaration des effets indésirables

Si vous remarquez des effets indésirables, veuillez en informer votre médecin, votre thérapeute ou votre pharmacien. Veuillez également le signaler à FROXIMUN AG en utilisant les coordonnées suivantes :

Fabricant et bureau de déclaration :	FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt
Téléphone :	+49 39401 632-0
Téléfax :	+49 39401 632-199
E-mail :	anwender@froximun.de
Personne responsable :	+49 39401 632-320

5. Comment conserver TOXAPREVENT® HALISTOP® ?

- conserver hors de portée des enfants
- conserver au sec et à une température comprise entre 5 °C - 40 °C
- protéger des rayons directs du soleil
- ne pas utiliser plus longtemps que prescrit
- à consommer jusqu'au : voir carton pliant ou gaufrage/impression sur le bord de l'emballage blister

6. Autres informations

Composants et autres constituants

1 blister contient 10 comprimés à mâcher à 1200 mg de MANC®, d'isomalt, d'arôme de citron, d'hydroxypropylcellulose, de stéarate de magnésium et de Stevia

FRANÇAIS



Informations relatives à MANC® :

- 100 % naturelle, sans gluten, sans lactose, végétal, minéral
- MANC : zéolite clinoptilolite naturelle

7. Fabricant de produits médicaux

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt,
Téléphone: +49 39401 632-0, Télécopie: +49 39401 632-199
Adresse e-mail: info@froximun.de

Date de la dernière révision de la notice: 2023-02-09



Conserver hors de
la portée des enfants

