

**POLSKI**

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem wyrobu medycznego.**

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek dalszych pytań należy zwrócić się do lekarza, terapeuty, farmaceuty lub bezpośrednio do firmy FROXIMUN AG jako producenta.
- Ten wyrób medyczny jest dostępny bez recepty i ogólnodostępny.

## 1. Co to jest TOXAPREVENT® MEDI PLUS i w jakim celu się go stosuje?

TOXAPREVENT® MEDI PURE PLUS w postaci proszku to naturalny wyrób medyczny zawierający mineralny składnik MANC®, naturalny zeolit klinoptylolit z dodatkiem węgla wapnia i magnezu. Służy wzmocnieniu bariery ściany jelita podczas powtarzającego obciążenia fizycznego organizmu. MANC® przechodzi przez przewód pokarmowy, wywiera tam swoje działanie i nie podlega metabolizmowi.

## 2. Co należy wiedzieć przed zastosowaniem TOXAPREVENT® MEDI PLUS?

- Saszetkę otworzyć bezpośrednio przed użyciem, przed wymieszaniem proszku z płynem.
- Zawsze otwierać tylko taką ilość saszetek, jaka ma być użyta w danym momencie.

### Nie wolno przyjmować TOXAPREVENT® MEDI PLUS:

- W przypadku rozpoznanej alergii lub nadwrażliwości na jeden lub więcej składników (patrz punkt 6: Składniki i komponenty)
- Ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania wyrobu medycznego w czasie ciąży i przez matki karmiące piersią, należy unikać stosowania TOXAPREVENT® podczas ciąży i karmienia piersią.

### Podczas przyjmowania TOXAPREVENT® MEDI PLUS należy zachować szczególną ostrożność:

- W rzadkich przypadkach przyjmowanie leku TOXAPREVENT® MEDI PLUS w postaci proszku może powodować zaparcia lub wzdęcia (rzadko: może dotyczyć 1 na 1000 leczonych osób)
- Osoby cierpiące na przewlekłe zaparcia powinny przyjmować TOXAPREVENT® MEDI PLUS w postaci proszku ze szczególną ostrożnością. W takich przypadkach przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, terapeutą lub farmaceutą.
- Podczas przyjmowania TOXAPREVENT® MEDI PLUS w postaci proszku należy zawsze przyjmować wystarczającą ilość płynów, aby przeciwdziałać zaparciom.
- Nie ma wystarczającego doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania TOXAPREVENT® MEDI PLUS u dzieci. Z tego względu nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
- W przypadku skłonności do tworzenia się kamieni nerkowych przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

### Stosowanie TOXAPREVENT® MEDI PLUS z innymi lekami:

Aby uniknąć niepożądanych interakcji z lekami, należy zachować odstęp 2 godzin w przyjmowaniu preparatu, ponieważ nie są dostępne żadne systematyczne badania dotyczące interakcji lub wpływu leków przyjmowanych wraz z TOXAPREVENT® MEDI PLUS w postaci proszku. W przypadku przyjmowania leków należy uzgodnić z lekarzem lub terapeutą odstępy czasu między przyjmowaniem TOXAPREVENT® MEDI PLUS.

## 3. Jak należy przyjmować TOXAPREVENT® MEDI PLUS?

- O ile lekarz lub terapeuta nie zaleci inaczej, należy przyjmować 1-2 saszetki TOXAPREVENT® MEDI PLUS około 30 minut przed posiłkiem, popijając dużą ilością płynu (np. 200 ml niegazowanej wody).
- Nie należy przekraczać maksymalnej dziennej dawki 2 saszetek (co odpowiada 2-krotnej zawartości 3 g).
- W przypadku ewentualnej zmiany dawkowania, należy się wcześniej skonsultować z lekarzem lub terapeutą.

### Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia TOXAPREVENT® MEDI PLUS nie powinien przekraczać 30 dni. W przypadku stałego przyjmowania wyrobu medycznego należy wprowadzić co najmniej tygodniową przerwę.

### Środki zaradcze w przypadku błędów w stosowaniu, przedawkowania i działań niepożądanych:

W razie przypadkowego przyjęcia większej dawki niż zalecana, mogą nasilić się działania niepożądane. W takich przypadkach zaleca się zmniejszenie ilości przyjmowanych saszetek do maksymalnie jednej dziennie lub zaprzestanie ich stosowania, jeśli to konieczne. Należy przy tym zapewnić zwiększone spożycie płynów. Jeśli działania niepożądane utrzymują się, należy przerwać stosowanie wyrobu medycznego i skonsultować się z lekarzem lub terapeutą.

## 4. Jakie mogą być działania niepożądane?

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaparcia lub wzdęcia (rzadko: pojawiają się u 1/1000 leczonych osób).

### Zgłaszanie działań niepożądanych

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy poinformować lekarza, terapeutę lub farmaceutę. Prosimy również o zgłaszanie ich do FROXIMUN AG, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

**POLSKI**

Producent i biuro sprawozdawcze: FROXIMUN AG, Neue Straße 2a,  
D - 38838 Schlanstedt  
Telefon: +49 (0) 39401 632-0  
Faks: +49 (0) 39401 632-199  
E-mail: anwender@froximun.de  
Osoba odpowiedzialna: +49 (0) 39401 632-320

**5. Jak należy przechowywać TOXAPREVENT® MEDI PLUS?**

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 40°C
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
- Nie używać po terminie
- Przydatność do użycia: patrz składane pudełko lub wytłoczenie/nadruk na krawędzi opakowania saszetki

**6. Więcej informacji**

**Składniki i inne komponenty**

- 1 saszetka zawiera 3000 mg proszku
- Składniki: MANC® (naturalny zeolit klinoptylolit), węglan wapnia, węglan magnezu

**Informacje na temat MANC®:**

- 100% naturalny, bezglutenowy, bez laktozy
- W przypadku MANC® chodzi o modyfikowany glinokrzemian.
- koszerne, halal: Niniejszym potwierdzamy, że MANC® jest produkowany z surowców mineralnych. Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, krwi ani jej produktów ubocznych, ani alkoholu.
- Do produkcji MANC® wykorzystywane są wyłącznie surowce pochodzenia mineralnego.

**Informacje na temat węglanu wapnia i węglanu magnezu:**

- bez alergenów
- koszerne, halal, wegetariańskie, wegańskie

**7. Informacje o producencie**

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt,  
Telefon: +49 39401 632-0, Faks: +49 39401 632-199,  
e-mail: info@froximun.de

*Niniejsza ulotka została ostatnio zmieniona: 2023-09-19*




**Ostrzeżenia i środki ostrożności**



Producent



Przestrzegać informacji  
zawartych w ulotce



Przechowywać w tempera-  
turze od 5°C do 40°C



LOT,  
Numer partii



Przechowywać w  
suchym miejscu



Przechowywać poza  
zasięgiem dzieci



Data  
ważności



Chronić przed  
światłem słonecznym



Wymieszać z płynem  
do spożycia