

10 oder 30 Pulversticks, je 3.000 mg
Wirkstoff: MANC® (Natur-Zeolith-Klinoptilolith)

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Medizinproduktes beginnen.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf, vielleicht möchten Sie diese später noch einmal lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Therapeuten, Apotheker oder direkt an die FROXIMUN AG als Hersteller.
- Dieses Medizinprodukt ist rezeptfrei und frei verkäuflich.

1. Was ist TOXAPREVENT® MEDI PLUS und wofür wird es angewendet?

TOXAPREVENT® MEDI PLUS in Pulverform ist ein natürliches Medizinprodukt mit dem mineralischen Wirkstoff MANC®, einem natürlichen Zeolith-Klinoptilolith mit dem PLUS an Calcium- und Magnesiumcarbonat. Es dient der Stärkung der Darmwandbarriere bei wiederkehrender physischer Belastung. Der Wirkstoff MANC® durchläuft den Verdauungstrakt, entfaltet dort seine physikalische Wirkung und wird nicht verstoffwechselt.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von TOXAPREVENT® MEDI PLUS beachten?

- Öffnen Sie die Stickverpackung erst unmittelbar vor der Anwendung, bevor Sie das Pulver in Flüssigkeit einrühren.
- Öffnen Sie immer nur die Menge an Stickverpackungen, die Sie zum Zeitpunkt der Entnahme anwenden möchten.

TOXAPREVENT® MEDI PLUS darf nicht eingenommen werden:

- Bei bekannter Allergie oder Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe. (siehe Punkt 6: Inhaltsstoffe und Bestandteile)
- Auf Grund sonstiger unzureichender Untersuchungen an schwangeren Frauen sowie stillenden Müttern soll auf die Einnahme von TOXAPREVENT® Medizinprodukten während der Schwangerschaft sowie der Stillzeit verzichtet werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von TOXAPREVENT® MEDI PLUS ist erforderlich bei:

- In seltenen Fällen kann die Einnahme von TOXAPREVENT® MEDI PLUS in Pulverform zu Verstopfungen (Obstipation) oder Blähungen führen. (selten: kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen)
- Wenn Sie unter einer chronischen Verstopfung leiden, dann sollten Sie die Einnahme von TOXAPREVENT® MEDI PLUS in Pulverform mit besonderer Vorsicht durchführen. In solchen Fällen beraten Sie sich vor der Einnahme mit Ihrem Arzt, Therapeuten oder Apotheker.
- Achten Sie stets auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr bei der Einnahme von TOXAPREVENT® MEDI PLUS in Pulverform, um obstipierenden (verstopfenden) Effekten entgegen zu wirken.
- Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen über die Einnahme von TOXAPREVENT® MEDI PLUS an Kindern vor. Daher wird die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen.
- Bei einer Neigung zur Nierensteinbildung konsultieren Sie bitte vor der Einnahme einen Arzt.

Bei der Einnahme von TOXAPREVENT® MEDI PLUS mit Medikamenten:

Um unerwünschte Wechselwirkungen mit Medikamenten zu vermeiden, ist ein Abstand von 2 Stunden einzuhalten, da keine systematischen Untersuchungen zu Wechselwirkungen oder Beeinflussungen von Medikamenten durch die Einnahme von TOXAPREVENT® MEDI PLUS in Pulverform vorliegen. Sollten Sie Medikamente einnehmen, stimmen Sie den zeitlichen Abstand der Einnahme von TOXAPREVENT® MEDI PLUS bitte mit Ihrem Arzt oder Therapeuten ab.

3. Wie ist TOXAPREVENT® MEDI PLUS einzunehmen?

- Falls von Ihrem Arzt oder Therapeuten nicht anders verordnet, nehmen Sie 1 – 2 Sticks TOXAPREVENT® MEDI PLUS ca. 30 Minuten vor einer Mahlzeit, mit reichlich Flüssigkeit (z. B. mit 200 ml stillem Wasser) ein.
- Eine Tageshöchstmenge von 2 Sticks (entspricht 2 mal 3 g Inhalt) sollte nicht überschritten werden.
- Sollten Sie von der Einnahmemenge abweichen wollen, so befragen Sie bitte zuvor Ihren Arzt oder Therapeuten.

Dauer der Anwendung

Die Dauer der Behandlung mit TOXAPREVENT® MEDI PLUS sollte 30 Tage nicht überschreiten. Bei wiederholter Einnahme sollte eine Anwendungspause von mindestens einer Woche eingehalten werden.

Gegenmaßnahmen bei Anwendungsfehlern, Überdosierung und Nebenwirkungen:

Wenn Sie versehentlich eine größere Menge als die vorgesehene Dosierung eingenommen haben, können verstärkt Nebenwirkungen auftreten. In diesen Fällen wird eine Reduzierung der Einnahmemenge auf maximal einen Stick pro Tag empfohlen oder stoppen Sie ggf. die Anwendung. Dabei ist auf eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr zu achten. Bei anhaltenden Nebenwirkungen stellen Sie die Einnahme ein und konsultieren Sie Ihren Arzt oder Therapeuten.

4. Welche Nebenwirkungen sind bekannt?

In seltenen Fällen kann es zu Verstopfung oder Blähungen kommen (selten: kann bis zu 1 von 1.000 behandelten betreffen).

Meldungen von Nebenwirkungen

Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt, Therapeuten, Apotheker und/ oder die unten aufgeführte E-Mail Adresse der FROXIMUN AG oder kontaktieren Sie uns unter der ebenfalls dort aufgeführten Service-Nummer.

Hersteller und Meldestelle: FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt
 Telefon: +49 (0) 39401 632-0
 Telefax: +49 (0) 39401 632-199
 E-Mail: anwender@froximun.de
 Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte: Fax: +49 (0) 39401 - 632 55 320 mobil: +49 (0) 151 - 113 175 16

5. Wie ist TOXAPREVENT® MEDI PLUS aufzubewahren?

- außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- trocken und zwischen 5°C - 40°C lagern
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- nicht länger verwenden als angegeben
- verwendbar bis: siehe Faltschachtel oder Prägung/Druck auf der Stickverpackung

6. Weitere Informationen

Inhaltsstoffe und sonstige Bestandteile

- 1 Stick enthält 3.000 mg Pulver
- Inhaltsstoffe: MANC® (Natur-Zeolith-Klinoptilolith), Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat

Information zum MANC®:

- 100 % natürlich, glutenfrei, laktosefrei
- Bei dem Wirkstoff handelt es sich um ein modifiziertes Alumosilikat.
- kosher, halal: Wir bestätigen hiermit, dass MANC® Produkt in einem Prozess aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Das Produkt enthält keine tierischen Bestandteile, Blut oder dessen Nebenprodukte sowie Alkohol.
- Bei der Produktion von MANC® kommen ausschließlich Rohstoffe mineralischen Ursprungs zum Einsatz.

Information zum Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat:

- allergenfrei
- kosher, halal, vegetarisch, vegan

7. Herstellerinformation

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt,
 Telefon: +49 39401 632-0, Telefax: +49 39401 632-199,
 eMail: info@froximun.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: 2020-07-22

10 or 30 powder sticks of 3,000 mg each
Active ingredient: MANC® (natural zeolite clinoptilolite)

Please read all of the information carefully before taking this medical device for the first time.

- Keep it in a safe place, as you might want to read it again later.
- If you have further questions, contact your physician, therapist or pharmacist or contact the manufacturer FROXIMUN AG directly.
- This is an over-the-counter medical product that does not require a prescription.

1. What is TOXAPREVENT® MEDI PLUS and what is it used for?

TOXAPREVENT® MEDI PLUS in powder form is a natural medical product that contains the mineral substance MANC®, a natural zeolite clinoptilolite PLUS calcium and magnesium carbonate. It is used to strengthen the intestinal wall barrier during recurrent physical stress. The active substance MANC® passes through the digestive tract, does its physical work and is not metabolized.

2. What do you need to know about TOXAPREVENT® MEDI PLUS before taking it?

- Do not open the stick pack until you are ready to use it, i.e. directly before you stir the powder into liquid.
- Open only the number of stick packs you wish to use immediately.

TOXAPREVENT® MEDI PLUS must not be taken in the following cases:

- if you have a known allergy or sensitivity to one or more constituents (see point 6: contents and constituents).
- Due to a lack of sufficient studies on pregnant women and nursing mothers, you should not take TOXAPREVENT® medical devices when you are pregnant or nursing.

Particular caution should be exercised when taking TOXAPREVENT® MEDI PLUS in the following cases:

- In rare cases, taking TOXAPREVENT® MEDI PLUS in powder form can lead to constipation or bloating (rare: this may affect 1 in 1,000 persons using it).
- If you suffer from chronic constipation, you should use particular caution when taking TOXAPREVENT® MEDI PLUS in powder form. In such cases, consult your physician, therapist or pharmacist before taking it.
- Always make sure that you drink enough liquid when you take TOXAPREVENT® MEDI PLUS in powder form in order to prevent constipation.
- As there is not enough empirical evidence on the use of TOXAPREVENT® MEDI PLUS by children, the use of this medical product is not recommended for children under 12 years of age.
- If you have difficulties with kidney stones, please consult a physician before taking this product.

If you take medications as well as TOXAPREVENT® MEDI PLUS:

To prevent adverse interactions with medications, you should always maintain a period of two hours between taking medications and taking TOXAPREVENT® MEDI PLUS in powder form, as there are no systematic studies on interactions with or influences on medications when taken with TOXAPREVENT® MEDI PLUS in powder form. If you take medication, consult your physician or therapist regarding the waiting time between taking TOXAPREVENT® MEDI PLUS and your medication.

3. How should TOXAPREVENT® MEDI PLUS be taken?

- Unless otherwise prescribed by your doctor or therapist, take 1-2 sachets about 30 minutes before a meal with plenty of liquid (e.g. with 200 ml non-carbonated water).
- Do not exceed a maximum daily quantity of 2 sticks (corresponds to 2 x 3 grams of powder).
- Should you wish to change the dosage, please consult your physician or therapist before doing so.

Duration of use

The duration of treatment with TOXAPREVENT® MEDI PLUS should not exceed 30 days. Should you wish to repeat the treatment, you should pause for at least one week before starting treatment again.

Countermeasures in the event of errors in use, overdoses and side effects

If you inadvertently take a dose larger than the dose specified in these instructions for use, you may experience more severe side effects. In such cases, you should reduce the dosage to a maximum of one stick per day or stop the treatment entirely. Increased fluid intake is important. If you experience sustained side effects, stop taking this product and consult your physician or therapist.

4. What are the known side effects?

In rare cases, taking TOXAPREVENT® MEDI PLUS in powder form can lead to constipation or bloating (rare: this may affect 1 in 1,000 persons using it).

Reporting side effects

If one of the listed side effects causes you considerable difficulty or you notice side effects that are not listed in these instructions for use, please inform your physician, therapist, pharmacist and/or send a message to the e-mail address of FROXIMUN AG listed below or contact us via one of the customer service numbers likewise listed below.

Manufacturer and reporting office: FROXIMUN AG, Neue Straße 2a D - 38838 Schlanstedt
 Phone: +49 (0) 39401 632-0
 Fax: +49 (0) 39401 632-199
 E-mail: anwender@froximun.de
 Safety officer for medical products: Fax: +49 (0) 39401 - 632 55 320 Mobile: +49 (0) 151 - 113 175 16

5. How should TOXAPREVENT® MEDI PLUS be stored?

- Keep out of reach of children!
- Store in a dry place at temperatures between 5°C - 40°C
- Keep out of direct sunlight.
- Do not use longer than specified.
- Expiration date: see bottom of the package or the stamp/imprint on the stick packaging.

6. Further information

Constituents and other components

- One stick contains 3,000 mg powder.
- Constituents: MANC® (natural zeolite clinoptilolite), calcium carbonate, magnesium carbonate

Information about MANC®

- 100% natural, Gluten-free, Lactose-free
- The active substance is a modified alumosilicate.
- Kosher/halal We herewith confirm that the MANC® product is manufactured from mineral raw materials in a process. The product contains no animal components, blood or by-products, and contains no alcohol.
- Only materials of mineral origin are used in the production of MANC®.

Information on calcium carbonate and magnesium carbonate

- Non-allergenic
- kosher, halal, vegetarian, vegan

7. Medical product manufacturer

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt,
 Phone: +49 39401 632-0, Fax: +49 39401 632-199,
 E-mail: info@froximun.de

These instructions were last updated on: 2020-07-22

10 ou 30 sticks de poudre de 3 000 mg
Substance : MANC® (clinoptilolite zéolite naturelle)

Veillez lire attentivement l'intégralité de la notice, avant d'utiliser le dispositif médical.

- Veillez conserver la notice d'utilisation. Vous pourriez avoir besoin de la relire ultérieurement.
- Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à votre médecin, thérapeute ou pharmacien ou directement à FROXIMUN AG en tant que fabricant.
- Ce dispositif médical est délivré sans ordonnance et est en vente libre.

1. Qu'est-ce que TOXAPREVENT® MEDI PLUS et dans quels cas est-il utilisé ?

TOXAPREVENT® MEDI PLUS sous forme de poudre est un dispositif médical naturel contenant la substance minérale MANC®, la clinoptilolite zéolite naturelle avec un plus en carbonate de calcium et de magnésium. Il sert à renforcer la barrière de la paroi intestinale en cas de contraintes physiques répétitives. La substance MANC® traverse le tractus intestinal où elle produit son effet physique. Elle ne sera pas métabolisée.

2. Que faut-il savoir avant l'usage de TOXAPREVENT® MEDI PLUS ?

- L'emballage des sticks ne doit être ouvert qu'immédiatement avant l'utilisation, avant de diluer la poudre dans du liquide.
- N'ouvrez que le nombre d'emballages dont vous avez besoin au moment de la prise du dispositif médical.

TOXAPREVENT® MEDI PLUS ne doit pas être utilisé :

- En cas d'allergie connue ou d'hypersensibilité à l'un ou plusieurs composants du médicament. (voir point 6 : Composants et substances)
- Il est indiqué de ne pas utiliser les dispositifs médicaux TOXAPREVENT® pendant la grossesse et l'allaitement en raison d'analyses insuffisantes sur les femmes enceintes ou allaitantes.

Il faut être particulièrement prudent lors de la prise de TOXAPREVENT® MEDI PLUS lorsque :

- Dans de rares cas, l'utilisation de TOXAPREVENT® MEDI PLUS sous forme de poudre peut provoquer une constipation (obstipation) ou des ballonnements. (rare : peut concerner jusqu'à une personne traitée sur 1 000).
- Si vous souffrez de constipation chronique, l'utilisation de TOXAPREVENT® MEDI PLUS sous forme de poudre nécessite une attention particulière. Dans ce cas-là, veuillez consulter votre médecin, thérapeute ou pharmacien avant la prise du dispositif médical.
- Veillez à boire suffisamment lors de la prise de TOXAPREVENT® MEDI PLUS sous forme de poudre, afin de prévenir les effets d'obstipation (constipation).
- Il n'existe aucune donnée suffisante sur l'utilisation de TOXAPREVENT® MEDI PLUS chez l'enfant. Par conséquent, il est recommandé de ne pas utiliser ce dispositif médical chez les enfants de moins de 12 ans.
- En cas de prédisposition à la formation de calculs rénaux, veuillez consulter votre médecin avant la prise de ce dispositif médical.

Lors de l'utilisation de TOXAPREVENT® MEDI PLUS avec des médicaments :

Étant donné qu'il n'existe aucune étude systématique au sujet des interactions ou influences médicamenteuses suite à la prise de TOXAPREVENT® MEDI PLUS sous forme de poudre, il est recommandé de respecter un intervalle de temps de 2 heures, pour éviter les interactions médicamenteuses indésirables. Si vous prenez des médicaments, déterminez l'intervalle de temps requis pour la prise de TOXAPREVENT® MEDI PLUS avec votre médecin ou thérapeute.

3. Comment faut-il prendre TOXAPREVENT® MEDI PLUS ?

- Sauf prescription contraire de votre médecin ou thérapeute, veuillez prendre 1 à 2 sachets dans suffisamment de liquide (p. ex. avec 200 ml d'eau plate) environ 30 minutes avant un repas.
- Une quantité maximale journalière de 2 sticks (correspond à 2 fois un contenu de 3 g) ne devrait pas être dépassée.
- Si vous souhaitez changer la prise journalière, veuillez consulter auparavant votre médecin ou thérapeute.

Durée d'utilisation

La durée du traitement avec TOXAPREVENT® MEDI PLUS ne doit pas dépasser 30 jours. En cas d'utilisation répétée, il convient de respecter une pause de 7 jours avant de reprendre le traitement.

Mesures à prendre en cas d'erreurs d'utilisation, de surdose et d'effets secondaires :

Si vous avez pris une dose supérieure à celle qui était prévue, des effets secondaires accrus peuvent apparaître. Dans ce cas-là, il est recommandé de réduire la prise à un stick par jour au maximum ou d'arrêter le cas échéant le traitement. En même temps, il faut veiller à une hydratation suffisante. En cas d'effets secondaires persistants, arrêtez le traitement et consultez votre médecin ou thérapeute.

4. Quels sont les effets secondaires possibles ?

Dans de rares cas, ce dispositif médical peut entraîner une constipation ou des ballonnements. (rare : peut concerner jusqu'à une personne traitée sur 1 000).

Déclarations d'effets secondaires

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave, ou si vous présentez des effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'utilisation, veuillez en informer votre médecin, thérapeute, pharmacien et/ ou l'adresse e-mail ci-dessous de FROXIMUN AG ou contactez-nous à l'aide du numéro d'assistance figurant également ci-dessous.

Fabricant et bureau de déclaration :	FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt
Téléphone :	+49 (0) 39401 632-0
Téléfax :	+49 (0) 39401 632-199
E-mail :	anwender@froximun.de
Délégué à la sécurité pour dispositifs médicaux :	Fax : +49 (0) 39401 - 632 55 320 Portable : +49 (0) 151 - 113 175 16

5. Où faut-il conserver TOXAPREVENT® MEDI PLUS ?

- Conserver hors de la portée des enfants
- Conserver dans un endroit sec et à une température entre 5°C - 40°C
- Protéger de l'ensoleillement direct
- Ne pas utiliser au-delà de la date indiquée
- date limite d'utilisation : voir carton pliable ou gaufrage/impression sur l'emballage des sticks

6. Autres informations

Composants et autres substances

- 1 stick contient 3 000 mg de poudre
- Composants : MANC® (clinoptilolite zéolite naturelle), carbonate de calcium, carbonate de magnésium

Information concernant MANC® :

- 100 % naturel, sans gluten, sans lactose
- Concernant la substance, il s'agit d'un aluminosilicate modifié
- Casher, halal : nous confirmons par la présente que le produit mentionné ci-dessus a été fabriqué selon un procédé avec des matières premières minérales. Le produit ne contient aucun constituant d'origine animale, du sang ou des produits dérivés du sang, ni d'alcool.
- Pour la production de MANC® seules des matières premières d'origine minérale sont utilisées.

Information concernant le carbonate de calcium, carbonate de magnésium :

- Sans allergène
- kascher, halal, végétarien, végétalien

7. Fabricant de produits médicaux

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt,
Téléphone: +49 39401 632-0, Télécopie: +49 39401 632-199,
Adresse e-mail: info@froximun.de

Date de la dernière révision de la notice: 2020-07-22

ITALIANO

INFORMAZIONI PER L'USO

10 o 30 stick di polvere, 3000 mg ciascuno

Principio attivo: MANC® (zeolite clinoptilolite naturale)

Leggere attentamente le istruzioni complete prima di iniziare ad assumere il dispositivo medico.

- Conservare le istruzioni per l'uso per poterle consultare in un secondo momento.
- Per eventuali domande consultare il medico, terapeuta, farmacista o direttamente la FROXIMUM AG come produttore.
- Questo dispositivo medico non è soggetto a prescrizioni e può essere venduto liberamente.

1. Cos'è TOXAPREVENT® MEDI PLUS e per cosa serve?

TOXAPREVENT® MEDI PLUS in polvere è un dispositivo medico naturale con il principio attivo minerale MANC®, una zeolite clinoptilolite naturale con l'aggiunta di carbonato di calcio e di magnesio. Serve a rafforzare la barriera intestinale in caso di sforzi fisici ripetuti. Il principio attivo MANC® passa nel tratto digestivo dove svolge la sua azione fisica e non viene metabolizzato.

2. Cosa bisogna considerare prima dell'assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS?

- Aprire la bustina stick appena prima dell'assunzione, prima di versarla nel liquido.
- Aprire solo la quantità di bustine stick da assumere al momento.

Evitare l'assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS nei seguenti casi:

- allergie o ipersensibilità verso uno o più ingredienti. (vedi punto 6: ingredienti ed eccipienti)
- Per mancanza di ulteriori studi su donne in gravidanza e durante l'allattamento è opportuno evitare l'assunzione del dispositivo medico TOXAPREVENT® durante la gravidanza e l'allattamento.

L'assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS richiede particolare attenzione:

- in casi rari l'assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS in polvere può causare costipazione o flatulenza. (raramente: può colpire da 1 a 1000 persone trattate)
- Se si soffre di costipazione cronica assumere TOXAPREVENT® MEDI PLUS in polvere con particolare attenzione. In questi casi consultare il medico, il terapeuta o il farmacista prima dell'assunzione.
- Prestare sempre attenzione a una corretta idratazione durante l'assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS in polvere, per evitare effetti di costipazione.
- Non esistono sufficienti dati sulla somministrazione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS ai bambini. Pertanto si sconsiglia l'uso ai bambini di età inferiore ai 12 anni.
- In caso di tendenza alla formazione di calcoli renali si prega di consultare un medico prima dell'assunzione.

Assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS insieme a farmaci:

Per evitare interazioni indesiderate con i farmaci rispettare una pausa di 2 ore poiché non esistono studi sistematici riguardo alle interazioni o influenze da farmaci indotte dall'assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS in polvere. In caso di assunzione di farmaci consultare il medico o il terapeuta per definire l'intervallo di assunzione di TOXAPREVENT® MEDI PLUS.

3. Come va assunto TOXAPREVENT® MEDI PLUS?

- Salvo prescrizioni diverse del medico o del terapeuta, assumere 1-2 bustine, circa 30 minuti prima dei pasti con abbondante liquido (ad es. con 200 ml di acqua naturale).
- Non superare una quantità giornaliera di 2 stick (corrisponde a 2-3 g di contenuto).
- Se si desidera modificare la quantità da assumere, consultare il medico o il terapeuta.

Durata del trattamento

La durata del trattamento con TOXAPREVENT® MEDI PLUS non deve superare i 30 giorni. In caso di assunzione ripetuta sospendere almeno una settimana prima di ripetere il ciclo.

Contromisure in caso di assunzione errata, sovradosaggio ed effetti collaterali:

Il caso di assunzione di una quantità superiore rispetto al dosaggio previsto possono manifestarsi effetti collaterali. In questi casi si consiglia di ridurre la quantità da assumere a un massimo di uno stick al giorno oppure di interrompere il trattamento e aumentare l'assunzione di liquidi. In caso di effetti collaterali persistenti interrompere l'assunzione e consultare il medico o il terapeuta.

4. Quali sono gli effetti collaterali noti?

In casi rari si possono manifestare costipazioni e flatulenze (raramente: può colpire da 1 a 1000 persone trattate).

Segnalazione di effetti collaterali

In caso di comparsa di uno degli effetti collaterali elencati o in presenza di altri effetti collaterali che non sono indicati nelle presenti istruzioni informare il medico, terapeuta, farmacista e/o l'indirizzo e-mail della FROXIMUM AG di seguito riportato o contattarci al numero di servizio indicato.

Produttore e ufficio di registrazione:	FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt
Telefono:	+49 (0) 39401 632-0
Fax:	+49 (0) 39401 632-199
E-mail:	anwender@froximun.de
Il Responsabile della sicurezza per dispositivi medici:	Fax +49 (0) 39401 - 632 55 320 cellulare +49 (0) 151 - 113 175 16

5. Come va conservato TOXAPREVENT® MEDI PLUS?

- tenere lontano dalla portata dei bambini
- conservare in luogo asciutto a temperatura tra 5°C e 40°C
- tenere al riparo dai raggi diretti del sole
- non usare più a lungo del tempo indicato
- utilizzabile fino a: vedi scatola pieghevole o impressione/stampa sulla confezione stick

6. Ulteriori informazioni

Ingredienti ed eccipienti

- 1 stick contiene 3000 mg di polvere
- Ingredienti: MANC® (zeolite clinoptilolite naturale), carbonato di calcio e di magnesio

Informazioni su MANC®:

- naturale al 100%, senza glutine, senza lattosio
- Il principio attivo è un aluminosilicato modificato.
- kosher, halal: Confermiamo che il prodotto MANC® viene realizzato con un processo da materie prime minerali. Il prodotto non contiene ingredienti di origine animale, sangue e suoi derivati o alcol.
- Per la produzione di MANC® vengono usate esclusivamente materie prime minerali.

Informazioni sul carbonato di calcio e di magnesio:

- è privo di allergeni
- kosher, halal, vegetariano, vegano

7. Produttore del prodotto medicinale

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt,
tel.: +49 39401 632-0; fax: +49 39401 632-199,
E-mail: info@froximun.de

Ultimo aggiornamento delle informazioni per l'uso: 2020-07-22

ESPAÑOL

INFORMACIÓN DE USO

10 o 30 sobres tipo stick de 3000 mg

Ingrediente: MANC® (zeolita clinoptilolita natural)

Lea detenidamente las instrucciones de uso en su totalidad antes de comenzar con la ingestión de este producto sanitario.

- Conserve estas instrucciones de uso. Puede que quiera volver a leerlas posteriormente.
- Si tiene alguna pregunta más, diríjase a su médico, terapeuta, farmacéutico o directamente a FROXIMUN AG como fabricante.
- El presente producto sanitario puede adquirirse sin receta médica y es de venta libre.

1. ¿Qué es TOXAPREVENT® MEDI PLUS y para qué se utiliza?

TOXAPREVENT® MEDI PLUS en forma de producto en polvo es un producto sanitario natural con el ingrediente mineral MANC®, una zeolita clinoptilolita de origen natural complementada con carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Sirve para fortalecer la barrera de la pared intestinal en caso de sobrecarga física recurrente. El ingrediente MANC® pasa por el tracto digestivo, donde ejerce su efecto físico sin ser metabolizado.

2. ¿Qué debe tener en cuenta antes de tomar TOXAPREVENT® MEDI PLUS?

- Abra el sobre tipo stick justo antes de utilizar el producto y disolverlo en líquido.
- Abra solamente aquel número de sobres tipo stick que quiera utilizar en el momento de la ingestión del producto.

El uso de TOXAPREVENT® MEDI PLUS está contraindicado en los siguientes casos:

- En caso de alergia o hipersensibilidad conocidas contra uno o varios de los ingredientes (ver el punto 6: Ingredientes y otros componentes).
- Al no existir suficientes estudios con mujeres embarazadas y madres lactantes, debe renunciarse a la toma de productos sanitarios TOXAPREVENT® durante el embarazo y el periodo de lactancia.

Precauciones especiales de empleo de TOXAPREVENT® MEDI PLUS:

- En raros casos, la toma de TOXAPREVENT® MEDI PLUS en forma de producto en polvo puede producir estreñimiento (obstipación) o flatulencia (raros casos: puede afectar a hasta 1 de 1000 personas en tratamiento).
- Si padece estreñimiento crónico, deje utilizar TOXAPREVENT® MEDI PLUS en forma de producto en polvo con especial precaución. En estos casos, consulte a su médico, terapeuta o farmacéutico antes de la ingestión del producto.
- Asegúrese de tomar siempre suficiente líquido durante el tratamiento con TOXAPREVENT® MEDI PLUS en forma de producto en polvo con objeto de evitar que el producto produzca obstipación (estreñimiento).
- No se dispone de suficiente experiencia acerca del uso de TOXAPREVENT® MEDI PLUS en niños. Por tal razón, no se recomienda su uso en niños de menos de 12 años de edad.
- En caso de predisposición a la formación de cálculos renales, consulte a un médico antes de la ingestión del producto.

Toma de TOXAPREVENT® MEDI PLUS con medicamentos:

Para evitar interacciones indeseadas con medicamentos, debe espaciar las tomas 2 horas, ya que no constan estudios sistemáticos sobre cómo la toma de TOXAPREVENT® MEDI PLUS en forma de producto en polvo puede interactuar con medicamentos o influenciar su efecto. Si toma medicamentos, determine con su médico o terapeuta el espacio de tiempo de debe esperar hasta la toma de TOXAPREVENT® MEDI PLUS.

3. Dosificación de TOXAPREVENT® MEDI PLUS

- A no ser que el médico o terapeuta le indiquen otra cosa, tome 1 a 2 sobres aproximadamente 30 minutos antes de una comida con gran cantidad de líquido (p. ej. con 200 ml de agua sin gas).
- No deberá excederse una dosis diaria máxima de 2 sobres tipo stick (corresponde a 2 veces un contenido de 3 g).
- Si desea variar la cantidad de producto a ingerir, consulte previamente a su médico o terapeuta.

Duración de la aplicación

La duración del tratamiento con TOXAPREVENT® MEDI PLUS no debe exceder los 30 días. En caso de una ingestión repetida, se debe hacer una pausa de, como mínimo, una semana.

Contraindicaciones en caso de uso incorrecto, sobredosis o efectos secundarios:

Si ha tomado accidentalmente una cantidad superior a la dosis prevista, la probabilidad de que se produzcan efectos secundarios es mayor. En tales casos, se recomienda reducir la cantidad a ingerir a máximo un sobre tipo stick por día o interrumpir, en su caso, el uso del producto. Es importante aumentar la toma de líquido. En caso de producirse efectos secundarios persistentes, interrumpa la toma del producto y consulte a su médico o terapeuta.

4. Efectos secundarios conocidos

En raros casos puede producirse estreñimiento o flatulencia (raros casos: puede afectar a hasta 1 de 1000 personas en tratamiento).

Notificación de efectos secundarios

Si uno de los efectos secundarios indicados le afecta considerablemente o si detecta algún efecto secundario no indicado en la presente información de uso, informe a su médico, terapeuta, farmacéutico y/o a FROXIMUN AG bajo la dirección de correo electrónico abajo indicada o bien póngase en contacto con nosotros llamando a la línea de atención al cliente indicada igualmente más abajo.

Fabricante y receptor de notificaciones:	FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt
Teléfono:	+49 (0) 39401 632-0
Teléfono:	+49 (0) 39401 632-199
E-mail:	anwender@froximun.de
Encargado de seguridad para productos sanitarios:	Fax: +49 (0) 39401 - 632 55 320 móvil: +49 (0) 151 - 113 175 16

5. Conservación de TOXAPREVENT® MEDI PLUS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar en un lugar seco y a una temperatura entre 5°C y 40°C.
- Proteger contra la radiación solar directa.
- No utilizar el producto por más tiempo del indicado.
- utilizar hasta: ver caja plegable o estampado/impresión en el embalaje del sobre

6. Información adicional

Ingredientes y otros componentes

- 1 sobre tipo stick contiene 3000 mg de producto en polvo.
- Ingredientes: MANC® (zeolita clinoptilolita natural), carbonato de calcio, carbonato de magnesio.

Información sobre MANC®:

- 100 % natural, sin gluten, sin lactosa
- Este ingrediente es un silicato de aluminio modificado.
- Kosher, halal: Por la presente confirmamos que MANC® es un producto que se elabora en un proceso a partir de materias primas minerales. Este producto no contiene ningún componente de origen animal, ni tampoco sangre o alguno de sus subproductos, ni alcohol.
- En la producción de MANC® se emplean exclusivamente materias primas de origen mineral.

Información sobre el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio:

- Libres de alérgenos.
- kosher, halal, vegetariano, vegano

7. Fabricante de productos médicos

FROXIMUN® AG, Neue Straße 2a, D - 38838 Schlanstedt,
Teléfono: +49 39401 632-0, Fax: +49 39401 632-199,
Correo electrónico: info@froximun.de

Fecha de la última actualización de esta información: 2020-07-22

Erläuterung des Symbols auf der Verpackung / Explanation of the symbol on the packaging / Explicación del símbolo sur l'emballage / Spiegazione del simbolo sulla confezione / Explicación del símbolo en el envase.



- außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- Keep out of reach of children!
- Conserver hors de la portée des enfants
- tenere lontano dalla portata dei bambini
- Mantener fuera del alcance de los niños.